Precise and Fast
Computation of
Generalized Fermi-Dirac
Integrals of Order $-1/2$,
 $1/2$, $3/2$, and $5/2$

or

門前の小僧、 習わぬ経を読む事

福島登志夫
(国立天文台)

ResearchGate Fukushima 検索

チャンドラセカール (1910-1995)

- ノーベル物理学賞 (1983)
- 白色矮星の質量限界
- **Study of Stellar Structure**
(1939) 当時29歳
 - 古今の名著、丁寧な論理展開
- 院生の時に読んだ記憶が...

統計力学の 三大分布関数

- マックスウェル・ボルツマン

$$p_{MB}(y) = \exp(-y)$$

- フェルミ・ディラック

$$p_{FD}(y) = \frac{1}{\exp(y) + 1}$$

- ボーズ・アインシュタイン

$$p_{BE}(y) = \frac{1}{\exp(y) - 1}$$

フェルミ粒子 状態方程式

$$\eta \equiv \frac{\mu}{k_B T}, \beta \equiv \frac{k_B T}{mc^2}$$

- 数密度、圧力、エネルギーの陰関数関係

$$N = N_0 \left[\beta^{3/2} F_{1/2}(\eta, \beta) + \beta^{5/2} F_{3/2}(\eta, \beta) \right]$$

$$P = P_0 \left[\beta^{5/2} F_{3/2}(\eta, \beta) + \beta^{7/2} F_{5/2}(\eta, \beta) / 2 \right]$$

$$E = E_0 \left[\beta^{5/2} F_{3/2}(\eta, \beta) + \beta^{7/2} F_{5/2}(\eta, \beta) \right]$$

- 一般化フェルミ・ディラック積分 $F_k(\eta, \beta)$

一般化フェルミ・ ディラック積分

- チャンドラセカル (1939)

$$F_k(\eta, \beta) = \int_0^{\infty} \frac{x^k \sqrt{1 + (\beta/2)x}}{\exp(x - \eta) + 1} dx$$

- 天体物理: $k=1/2, 3/2, 5/2$
- 固体物理: $k=-1/2, 0, 1/2, 1, \dots$

ηとβの範囲

- $-40 < \eta < 10^5$ 、反粒子(陽電子等) $\eta < 0$
- β : 天文(温度質量比)
- β : 半導体

天体	電子・陽電子	陽子・中性子
太陽表面	9.75E-7	5.31E-10
白色矮星表面	4.4E-6	2.4E-9
太陽中心部	2.65E-3	1.44E-6
Heフラッシュ	0.034	1.8E-5
Ne燃焼	0.2	1E-4
鉄の光分解	8	4E-3
超新星爆発	160	0.08

- 非線形項の強さ

半導体	
Ge	0.0156
Si	0.0362
GaAs	0.0452
InAs	0.143
InSb	0.299

温度・密度から圧力へ

- 温度 $\rightarrow\beta$, 密度 $\rightarrow N$, 未知数 η $N(\eta) = N$
- 1. 非線形密度方程式を解いて η を求める
 - 初期推定値: 低温極限($\beta=0$)の解など
 - 微分補正(ニュートン法など): N の η 偏微分が必要
- 2. $(\beta, \eta) \rightarrow P$, 比熱, ...
 - 注意: N, P, E の β や η に関する偏微分係数が必要

低温極限: $\beta=0$

- 密度方程式: $N \propto F_{1/2}(\eta)$

- $F_k(\eta)$: フェルミ・ディラック積分

$$F_k(\eta) = \int_0^{\infty} \frac{x^k dx}{\exp(x-\eta)+1}$$

- 順問題: **区分ミニマックス有理近似**

- Fukushima (2015a, Appl. Math. Comp.) in printing
- 非常に高速、 η の全領域、整数次数 + 半整数次数

- 逆問題: $u = F_{1/2}(\eta)$ から $\eta = H(u)$ を求める

- Fukushima (2015b, AMC) in printing
- **区分ミニマックス有理近似**: 非常に高速、全領域

N, P, Eの η, β 偏微分計算

- 例: Nの一階偏微分

$$\frac{1}{N_0} \left(\frac{\partial N}{\partial \eta} \right)_{\beta} = \beta^{3/2} \frac{\partial F_{1/2}}{\partial \eta} + \beta^{5/2} \frac{\partial F_{3/2}}{\partial \eta}$$

$$\frac{1}{N_0} \left(\frac{\partial N}{\partial \beta} \right)_{\eta} = \frac{3}{2} \beta^{1/2} F_{1/2} + \frac{5}{2} \beta^{3/2} F_{3/2} + \beta^{3/2} \frac{\partial F_{1/2}}{\partial \beta} + \beta^{5/2} \frac{\partial F_{3/2}}{\partial \beta}$$

- 結局、一般化フェルミ・ディラック積分の η, β 偏微分計算に**帰着**

フェルミ・ディラック積分 の高速計算法

- Fukushima (2015a)
- 区分ミニマックス有理近似
- 有理次数: (3,3)-(10,10)
- 適用次数: $k = 0(1)10, -9/2(1)21/2$
- 区分点値: $\eta = -2, 0, 2, 5, 10, 20, 40$
- 計算時間: $\exp(\eta)$ の0.44-1.1倍**非常に高速**

$$F_k(\eta) \approx \frac{\sum_{n=0}^N P_{kn} \eta^n}{\sum_{m=0}^M Q_{km} \eta^m}$$

一般化フェルミ・ディラック積分の従来の計算法

- 解析的: 高精度計算は**困難**
- 数值的: (Numerical Recipe 第3版, 6.10節)
 - 二重指数型数値積分法(高橋・森、1974)
 - 半無限積分区間を2分割(分割点: $x=\eta$)
 - **低速**: 関数評価回数 ($M=50-600$)

温故知新

- **ゾンマーフェルト展開**: 解析的
 - Sommerfeld (1927) (当時59歳)
 - Fukushima (2014a): 高次展開
 - 高速 ($M \sim 7$) だが限界あり ($\eta > \eta_s \sim 8-30$)
- **マクドガル・ストーナー法**: 数値積分
 - McDougall & Stoner (1938): $F_{1/2}(\eta)$
 - Fukushima (2014b): FD分布の任意積分へ拡張
 - 任意の β 、 η に適用可、まだ低速 ($M \sim 100-160$)

ゾンマーフェルト展開

- 元論文: Sommerfeld (1928)

$$\int_0^{\infty} \frac{f(x) dx}{\exp(x-\eta)+1} \sim \int_0^{\eta} f(x) dx + 2 \sum_{m=1}^{\infty} c_{2m} f^{(2m-1)}(\eta)$$

- 致命的欠点: 発散級数

$$c_n \equiv (1 - 2^{1-n}) \zeta(n)$$

- 修正論文: Fukushima (2014a, AMC)

- 適当な打ち切りで効果的収束
- **高速**だが、 η の値に適用限界あり

Degree dependence of relative error of $S_k^{(M)}(\eta, \beta)$

マクドガル・ストーナー法

- 元論文: McDougall & Stoner (1938)

$$\int_0^{\infty} \frac{f(x) dx}{\exp(x-\eta)+1} = \int_0^{\eta} f(x) dx + \int_0^{\eta} \frac{\Delta f(z, \eta) dx}{\exp(z)+1} + \int_{\eta}^{\infty} \frac{f(z+\eta) dx}{\exp(z)+1}$$

- 巧妙な書き換え

$$\Delta f \equiv f(\eta+z) - f(\eta-z)$$

- 第2項 / 第1項: η のべき乗で減少
- 第3項 / 第1項: η の指数関数で減少
- 応用論文: Fukushima (2014b, AMC)

新しい解析的計算法

- 一般化因子を
ミニマックス多項式近似

$$\sqrt{1 + \frac{x}{2}} \approx \sum_{j=0}^J g_j x^j$$

- フェルミ・ディラック積分の多項式で近似可

$$F_k(\eta, \beta) \approx \sum_{j=0}^J g_j \beta^j F_{k+j}(\eta)$$

$$F_k(\eta) = F_k(\eta, 0)$$

- 長所: **並列計算**可、偏微分の自動計算
- 限界: $\beta < \beta_s$

偏微分の解析計算

- 自明な β 偏微分 $\frac{\partial F_k(\eta, \beta)}{\partial \beta} \approx \sum_{j=1}^J j g_j \beta^{j-1} F_{k+j}(\eta)$
- フェルミ・ディラック積分の微分公式 $\frac{dF_k(\eta)}{d\eta} = k F_{k-1}(\eta)$
- η 偏微分 $\frac{\partial F_k(\eta, \beta)}{\partial \eta} \approx \sum_{j=0}^J (k+j) g_j \beta^j F_{k+j-1}(\eta)$
- 長所: 繰り返し適用可、**並列計算可**

Relative error of $F_k(\eta, \beta)$: single precision

Relative error of $F_k(\eta, \beta)$: double precision

計算時間の比較

- 倍精度計算、インテル Fortran 12.1
- μs @ Intel Core i7-4600U

k	数値積分	新方法
1/2	21.7	0.170
1/2, 3/2	40.3	0.174
1/2, 3/2, 5/2	60.5	0.176

新方法の守備範囲

天体	電子・陽電子	陽子・中性子
太陽表面	9.75E-7	5.31E-10
白色矮星表面	4.4E-6	2.4E-9
太陽中心部	2.65E-3	1.44E-6
Heフラッシュ	0.034	1.8E-5
Ne燃焼	0.2	1E-4
鉄の光分解	8	4E-3
超新星爆発	160	0.08

半導体	
Ge	0.0156
Si	0.0362
GaAs	0.0452
InAs	0.143
InSb*	0.299

*: 6ケタ精度

結論

■ 手法

- 一般化因子をミニマックス近似
- フェルミ・ディラック積分の多項式に帰着

■ 性能

- 単精度: 近似次数 8, $\beta < 0.21$, $\eta < \eta_S \sim 8$
- 倍精度: 近似次数 7, $\beta < 0.0040$, $\eta < \eta_S \sim 30$
- 数値積分に比べて**70-450倍の加速**

■ 宿題: 大きい β 、小さい η の場合

参考文献

- Sommerfeld, 1927, Z. Phys., 47: 1-32
- McDougall & Stoner, 1938, Phil. Trans. R. Soc. London Ser. A, 237: 67-104
- Fukushima, 2014a, Appl. Math. Comp., 234: 417-433
- Fukushima, 2014b, Appl. Math. Comp., 238: 485-510
- Fukushima, 2015a, Appl. Math. Comp., in printing
- Fukushima, 2015b, Appl. Math. Comp., in printing
- Fukushima, 2015c, Appl. Math. Comp., submitted

ResearchGate Fukushima

検索

Fortran プログラム、
論文PDFなど入手可能