

# 放射線・放射性物質とは

- 素粒子・原子核物理の研究者として -

東北大学大学院理学研究科物理学専攻  
助教 金田雅司

今日の講義のスライドは

<http://lambda.phys.tohoku.ac.jp/~kaneta/>  
から、後日ダウンロード出来るようにします

# この授業のポイント

物質は何から出来ている？

放射性物質と放射線

素粒子・原子核の研究



講義に入る前に

# 自己紹介

何してる人？

専門


# 素粒子・原子核物理 (実験)




# 経歴

出身：広島県世羅郡

小中高と地元の公立



広島大学教育学部教科教育学科  
広島大学大学院理学研究科物理学専攻



アメリカ合衆国で  
ポスドク研究員（6年弱）

ローレンス・バークレイ国立研究所  
ブルックヘブン国立研究所



日本に戻ってきて、7年目

東北大学大学院理学研究科物理学専攻

原子核物理研究室

助教

研究と教育に従事

なお、物理学者は白衣を着ません

「ガリレオ」の湯川先生は典型的なステレオタイプ





# 物質は何から 出来ている？




# 物質の最小単位は？哲学者の考え

## ギリシャ哲学

レウキッポス

デモクリトス



これ以上  
“分解できないもの”  
**ἄτομος** (atomos)  
がある


## 近代哲学

デカルト




どんなに細かくしても  
さらに分割出来る






同じくらいの比率のもの



太陽から土星までの距離  
1,400,000,000 [km]



野球場の外野まで距離  
約 100 m



ビー玉  
約 1 cm




ボールペンのボール  
約 1 mm




# 現在素粒子と考えられているもの

## クォーク




## レプトン



クォークとレプトンには  
それぞれの反粒子が存在する

## ゲージ粒子



光子(フォトン): 電磁気力



グルーオン: 強い力



W,Zボゾン:  
弱い力



重力子(グラビトン): 重力  
未発見



ヒッグス粒子: 素粒子の質量

自然界の四つの力を伝える仮想粒子



# クォークから出来ているもの = ハドロン

## クォーク三つ バリオン

陽子

$u$   
 $d$   $u$

中性子

$u$   
 $d$   $d$

$\Lambda$  (ラムダ)

$u$   
 $d$   $s$

## クォークと反クォーク メソン (中間子)



写真: [http://www.yukawa.kyoto-u.ac.jp/contents/about\\_us/history.html](http://www.yukawa.kyoto-u.ac.jp/contents/about_us/history.html) より

湯川秀樹博士によって  
予言。後に発見され、  
1949年ノーベル  
物理学賞を受賞

$u$   $\bar{d}$

$\pi^+$

$s$   $\bar{u}$

$K^+$

ここに挙げたよりもさらに数多くのバリオンとメソン



# 元素（原子）の種類

周期表：物理的・化学的に似た元素を並べたもの

|    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |    |     |    |     |     |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|----|-----|----|-----|-----|
| H  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | He |    |    |    |    |    |    |    |    |     |    |     |    |     |     |
| Li | Be |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | B  | C  | N  | O  | F  | Ne |    |    |    |    |     |    |     |    |     |     |
| Na | Mg |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | Al | Si | P  | S  | Cl | Ar |    |    |    |    |     |    |     |    |     |     |
| K  | Ca |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | Sc | Ti | V  | Cr | Mn | Fe | Co | Ni | Cu | Zn | Ga  | Ge | As  | Se | Br  | Kr  |
| Rb | Sr |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | Y  | Zr | Nb | Mo | Tc | Ru | Rh | Pd | Ag | Cd | In  | Sn | Sb  | Te | I   | Xe  |
| Cs | Ba | La | Ce | Pr | Nd | Pm | Sm | Eu | Gd | Tb | Dy | Ho | Er | Tm | Yb | Lu | Hf | Ta | W  | Re | Os | Ir | Pt | Au | Hg | Tl  | Pb | Bi  | Po | At  | Rn  |
| Fr | Ra | Ac | Th | Pa | U  | Np | Pu | Am | Cm | Bk | Cf | Es | Fm | Md | No | Lr | Rf | Db | Sg | Bh | Hs | Mt | Ds | Rg | Cn | Uut | Fl | Uup | Lv | Uus | Uuo |

## ● 元素の性質

- 原子中の電子配置が決定
- 電子の個数 = 原子核中の陽子の個数

## 1 1 3番元素

2004年9月28日

理化学研究所の線形加速器を用い  
亜鉛とビスマスを衝突させて合成に成功と発表

2012年9月28日

三個目の113番元素の合成を確認。

命名はまだ。

候補：ジャポニウム、ニッポニウム



# 原子核の種類

- 陽子と中性子の組み合わせ
  - 電磁気力と核力のバランス
  - 同位体の存在
    - 陽子数が同じで中性子数が異なる

- 電磁気力
  - 陽子と陽子：プラスの電荷同士なので斥力
- 核力
  - 陽子と陽子、陽子と中性子、中性子と中性子
    - 離れると引力
    - 近づき過ぎると斥力

中性子数



# 放射性物質

## と

# 放射線



性質

測定

リスク



# 性質



人間の生活スケールと比べると


# 非常に小さな世界



# 原子核の崩壊(壊変)

$\beta$  (ベータ)崩壊

$\gamma$  (ガンマ)崩壊



一つ一つの原子核がいつ崩壊するか：わからない（しかし、平均時間はわかる）  
ガンマ線のエネルギーは原子核ごとに異なる



# 放射線の種類

## 原子の中から発生する物

### 電子軌道から

X線 = 光子

### 原子核から

$\alpha$  (アルファ) 線 = ヘリウム4の原子核

$\beta$  (ベータ) 線 = 電子・陽電子

$\gamma$  (ガンマ) 線 = 光子

中性子

## 宇宙から降り注ぐもの

### 宇宙線

$\mu$  (ミュー) 粒子 = 素粒子の一種、電子の仲間

## 人工放射線

### 加速器を使用

電子、陽子、イオン自身を加速し取り出す

シンクロトロン放射・制動放射を利用し電磁波

(紫外光、X線、 $\gamma$ 線) を生成させる



# 核分裂



重たい原子核が、二つ（まれに三つ以上）の原子核に分裂

自然に起きる

中性子、陽子、ガンマ線、ベータ線の吸収によって起きる

原子炉のウラン燃料

$^{235}\text{U}$ が3-5% その他は核分裂をしないウラン




<http://www.rist.or.jp/atomica/data/pict/03/03060304/03.gif>





# 半減期

半減期分の時間が経過すると、  
放射性物質の量が半分になる





# 放射性物質の性質

## 放射線を出すプロセス

極小の世界の現象：100兆分の1 m（原子核の大きさ）  
量子力学の世界（＝物事が確率現象として起きる）

## 反応のエネルギー

keV ～ MeV（千～百万 電子ボルト）のオーダー

比較：化学反応（＝分子・原子間での電子のやりとり）は、約数eV

$$1 \text{ [eV]} = 1.6 \times 10^{-19} \text{ [J]}$$

化学反応は、モル数（ $6.02 \times 10^{23}$ 個）の数のオーダーであることに注意



# 放射性物質の性質

## 化学反応では原子核は変わらない

錬金術が成り立たない理由

化学反応は、原子核の周りを回っている電子の状態が決める

電子がどこにいるか、何個いるか

## 当然、生物の力でも原子核は変わらない

「生物の力で放射性物質を別の物に変える」←あり得ない！！！！

## 特定の元素を集める生物は存在する

期待ほどの効果無し：ヒマワリ、菜種による土壤中セシウム吸収（農水省の実験）

濃縮した放射性物質はどこに持って行く？



# 単位

Bq (ベクレル)

一秒間に一個の原子核が崩壊すること  
放射能の単位

Sv (シーベルト)

放射線による生体への影響の強さを示す

外部被曝も内部被曝も同じシーベルト数なら同じ影響



$^{134}\text{Cs}$

2.07 年

$2.1 \times 10^{-14} \text{ g}$

$^{137}\text{Cs}$

30.1 年

$3.1 \times 10^{-13} \text{ g}$

$^{40}\text{K}$

12億8千万 年

$3.9 \times 10^{-6} \text{ g}$

半減期 と 1 Bq 相当の質量(g)



# 桁の記号

| 記号    | 読み方  | 漢数字   | 指数表示       |
|-------|------|-------|------------|
| P     | ペタ   | 千兆    | $10^{15}$  |
| T     | テラ   | 一兆    | $10^{12}$  |
| G     | ギガ   | 十億    | $10^9$     |
| M     | メガ   | 百万    | $10^6$     |
| k     | キロ   | 千     | $10^3$     |
|       |      | 一     | $10$       |
| m     | ミリ   | 千分の一  | $10^{-3}$  |
| $\mu$ | マイクロ | 百万分の一 | $10^{-6}$  |
| n     | ナノ   | 十億分の一 | $10^{-9}$  |
| p     | ピコ   | 一兆分の一 | $10^{-12}$ |



# 質問



# 放射性物質の無い世界

## は作れますか？

はい・いいえ



答

いいえ



# 自然放射線

天然放射線

$^{40}\text{K}$ 、ラドンなどから

宇宙線

地球上での典型的範囲


1～10 mSv/年

平均値 2.4 mSv/年

日本全国平均値

0.99 mSv/年

自然放射線による年間実効線量の世界平均的な値(国連科学委員会の推定)



数値の出典: [http://www.rist.or.jp/atomica/data/dat\\_detail.php?Title\\_No=09-01-05-04](http://www.rist.or.jp/atomica/data/dat_detail.php?Title_No=09-01-05-04)




# 日本地域別の自然放射線

日本地質学会の  
ウェブページより

西日本が高め




岩石の組成による



<http://www.geosociety.jp/hazard/content0058.html>

# 通常さらされている放射線



宇宙線

$^{40}\text{K}$ 等からの  
ガンマ線


ラドンの吸引  
α線内部被曝

体内には常に  
 $^{40}\text{K}$ が約4000 Bq  
⇒約0.17mSv/年



# 放射線と生体の反応

## イオン化（電離）



壊れる分子構造

ラジカル(オゾンや過酸化酸素)の発生

# 測定



通常、我々が考える測定


例えば体重測定

体重計に乗るたびに数値が変わると、、、

そんな  
ばかな！

壊れてるに  
違いない

役に立たないよ！




# ゆれる

1 秒あたりの放射線の個数

エネルギー測定値



概念図



放射線が通過

電気パルス（信号）が発生

人間の考える理想

電気パルス = 元の放射線のエネルギーに一対一対応

現実（＝自然界の法則）

放射線と物質の反応：確率的に起きる（量子力学の世界）

同じエネルギーの放射線が一つ通過したときにいつも同じ信号にならない  
反応したり、しなかったりもする



# ゆれる

放射線の放出  
放射線と物質の反応

確率で現象が起きる  
量子力学の世界



リヌク

# その前に 質問



# 微量の放射性物質を含む食品をとることについて

1. 絶対いやだ
2. 規制値以下なら気にしない
3. 一回位なら規制値の倍でも気にしない

どの意見に一番近いですか？

正しい答えは  
ありません



個人の価値観は  
自然科学では答えられない

しかし

判断の基準となる  
数値を示すことは出来る

# 数値を知る





知彼知己  
百戰不殆  
不知彼而知己  
一勝一負  
不知彼而知己  
每戰必殆

孫子より



# 土壌測定



## 福島第一原子力発電所周辺の「放射線量等分布マップ作成」プロジェクト

国内の多くの研究者の協力を得て、6－7月に土壌採取、7－8月にガンマ線の測定。

土壌の採取には大阪大学とJAEAが中心となり、東北大を含む94の大学等研究協力機関と民間企業3社から409人の科学者等が参加。

<http://www.rcnp.osaka-u.ac.jp/dojo/>



# 放射線の生体への影響

## 確定的影響

ある放射線量を超えると現れると考えられている  
がん・遺伝的影響以外

皮膚障害、白内障、組織障害、個体死等

## 確率的影響

DNAが少しずつ傷つくことで、後から出てくると考えられている影響



# 国際放射線防護委員会の勧告

## 確率的影響

~~ある値を超えたら危険~~

~~ある値以下なら安全~~

閾値なし・線形モデル



# 国際放射線防護委員会の勧告

## 放射線被曝


社会的・経済的要因を考慮に入れながら  
合理的に達成できる限り低くする

# リスクの見積もり



# 確率的影響

## 原爆被害者 への調査から



線量区間における平均線量 (mSv 中性子はRBE=10)

注: 図中の数字は5-50, 5-100, 5-125, 5-150, 5-200, 5-500及び5-1,000mSv区間における平均線量(mSv)。

◇: 統計的に有意( $p < 0.05$ )、△: 有意でない( $p > 0.05$ )。直線は図1と同じリスク係数0.53/Sv。

下記の出典の数値をもとに作成した。(平均線量は混成対数正規分布により推定)

**図3 低線量域における原爆被爆者の固形がんERRにおける直線性  
(1950-1997年調査)**

[出典]D. L. Preston, 清水由紀子ら: 放射線報告書No.24-02、原爆被爆者の死亡率調査 第13報  
固形がんおよびがん以外の疾患による死亡率: 1950-1997年、p.15

図の出展: 「放射線のリスク評価」

[http://www.rist.or.jp/atomica/data/dat\\_detail.php?Title\\_No=09-02-03-06](http://www.rist.or.jp/atomica/data/dat_detail.php?Title_No=09-02-03-06)

ERR: Excess Relative Risk, 過剰相対リスク

# 放射線のリスク評価

## ICRP(国際放射線防護委員会)の考え方

放射性への生体への確率的影響

線量の増加に応じて増えている

しかし、1 Sv 以下では、その形が正確にどうなっているかは統計誤差も大きく不明

リスクの増加は、放射線量に比例すると“仮定”

閾値なし・線形モデル (Linear, Non Threshold (LNT) model)

LNTモデルによる評価 (ICRP1990勧告)

致死性の発癌率の増加を、1000 mSv あたり、5% と評価

自然・医療被曝以外の「追加」被曝は年 1mSvが望ましいと勧告

## このリスクは他のリスクに比べて大きいのか

タバコによるがんのリスク： 男性(女性)の非喫煙者の2(1.6)倍

出展： 国立がん研究センター [http://ganjoho.jp/public/pre\\_scr/cause/smoking.html](http://ganjoho.jp/public/pre_scr/cause/smoking.html)

ただし、平均的個人は存在しない



# 内部被曝の評価

## 核種ごとに評価

元素によって体内に蓄積される場所が違う

ヨウ素：甲状腺

セシウム：全身（主に筋肉）、カリウムと同じ場所に蓄積される

ストロンチウム：骨

代謝によって体外に排出される影響も考慮

摂取後50年後（乳児・幼児は70歳まで）までの全被曝量を評価  
＝預託線量

## 福島第一原発から放出された放射性物質

ヨウ素：半減期8日なので現在は土壌中には殆どない

セシウム： $^{134}\text{Cs}$ （半減期約2年）と $^{137}\text{Cs}$ （半減期約30年）

2011年4月時点での土壌中のベクレル比は、おおよそ1:1

ストロンチウム：地表には殆ど降っていない（セシウムの1/2000～1/4000）文部科学省の調査



# 幼児が外で遊んでいる場合のリスクの見積もり

東北大青葉山キャンパス 2012年6月の土壌

Cs134: 250 Bq/kg

Cs137: 250 Bq/kg

毎日1 g の土が口に入り飲み込んだと仮定。

それぞれのセシウムは、

年間  $250 \times 0.001 \times 365 = 91.25$  Bq。

実効線量は、

$91.25 \times 0.013 + 91.25 \times 0.010 =$

$1.18625 + 0.9125 = 2.1$  [ $\mu$ Sv]

食物による内部被曝の世界平均

一年あたり  $0.29$  mSv =  $290$   $\mu$ Sv

100分の1弱だけリスクが増えたことに相当

私（金田）はこの100分の1弱のリスク増は気にしない

自分の子供が外で遊ぶことを止めさせていないし、マスクもさせていない

出典: <http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000001558e-img/2r98520000015cfn.pdf>

注: 元のデータの換算係数は、mSv/Bq ですが、ここでは $\mu$ Sv/Bqになおしています。

別表4 経口摂取による実効線量及び甲状腺等価線量への換算係数

| 核種     | 線量係数 [ $\mu$ Sv/Bq] |        |            |            |        |
|--------|---------------------|--------|------------|------------|--------|
|        | 乳児                  | 幼児     | 少年         | 青年         | 成人     |
| Sr-89  | 0.036               | 0.0089 | 0.0058     | 0.0040     | 0.0026 |
| Sr-90  | 0.23                | 0.047  | 0.060      | 0.080      | 0.028  |
| I-131  | 0.14                | 0.075  | ( 0.038 )  | ( 0.025 )  | 0.016  |
| I-133  | 0.038               | 0.017  | ( 0.0072 ) | ( 0.0049 ) | 0.0031 |
| Cs-134 | 0.026               | 0.013  | 0.014      | 0.019      | 0.019  |
| Cs-137 | 0.021               | 0.010  | 0.010      | 0.013      | 0.013  |
| U-234  | 0.37                | 0.088  | 0.074      | 0.074      | 0.049  |
| U-235  | 0.35                | 0.085  | 0.071      | 0.070      | 0.047  |
| U-238  | 0.34                | 0.080  | 0.068      | 0.067      | 0.045  |
| Pu-238 | 4.0                 | 0.31   | 0.24       | 0.22       | 0.23   |
| Pu-239 | 4.2                 | 0.33   | 0.27       | 0.24       | 0.25   |
| Pu-240 | 4.2                 | 0.33   | 0.27       | 0.24       | 0.25   |
| Pu-241 | 0.056               | 0.0060 | 0.0050     | 0.0050     | 0.0050 |
| Pu-242 | 4.0                 | 0.32   | 0.26       | 0.23       | 0.24   |

| 核種    | 等価線量(甲状腺) |      |          |           |       |
|-------|-----------|------|----------|-----------|-------|
|       | 乳児        | 幼児   | 少年       | 青年        | 成人    |
| I-131 | 2.8       | 1.5  | ( 0.76 ) | ( 0.50 )  | 0.32  |
| I-133 | 0.73      | 0.33 | ( 0.14 ) | ( 0.093 ) | 0.059 |

ICRP-56(1989),- 67(1993),- 69(1995),- 72(1996)より引用。( )内の数値はICRP-72(1996)及び「環境放射線モニタリングに関する指針」(平成12年8月一部改訂2000)を基に年齢補正を行った試算値。

(出典:平成12年度厚生科学特別研究「原子力施設の事故等緊急時における食品中の放射能の測定と安全性評価に関する研究」)

半減期: 28.90年  
半減期: 8.02日

半減期: 2.06年  
半減期: 30.07年

<http://lambda.phys.tohoku.ac.jp/~kaneta/> 左側のメニューから「備忘録」のページへ行き

「経口摂取による実効線量および甲状腺透過線量への換算係数の抜粋」の下行の「[グーグル・ドキュメントのスプレッドシート](#)」のリンク



# 放射性物質について

性質 測定 リスク



# 素粒子 原子核 の研究



# 素粒子物理学

物質の最小単位、第一原理の追求

“標準理論”を超えた素粒子の探索

自然界の四つの力の統合

宇宙物理とのつながり

ビッグバン

消えた反物質

等々



# 現代の原子核物理

原子核そのものだけではなく  
クォークから出来ているものの全てが対象

第一原理の追求（＝素粒子物理）ではなく

どのようにハドロンが作られているのか？


核力の性質は？

質量の起源は？


原子核を構成している陽子・中性子の  
質量の源は、真空中に凝縮されているクォーク・反クォーク対による場から  
ヒッグス場は、素粒子に質量を与える



# 宇宙における物質の進化



Original: poster of CERN microcosm



中性子星（高密度核物質）  
の生成および内部の状態

超新星爆発における  
重元素の合成

クォーク-グルーオン・プラズマから  
ハドロンへの相転移（核子の生成）



# 極微の世界の探索

粒子 (電子、陽子、原子核) を

加速して

衝突させて

壊して

中から出てくる物を調べる




# 加速器

荷電粒子を加速する装置

電磁気学の応用

+と-の電荷は引き合い  
+同士、-同士は反発する



マイナスの電荷を持った電子は  
+に引き寄せられる




# 加速器

荷電粒子を加速する装置

電磁気学の応用

+と-の電荷は引き合い  
+同士、-同士は反発する



マイナスの電荷を持った電子は  
+に引き寄せられる




# 加速器

荷電粒子を加速する装置

電磁気学の応用

+と-の電荷は引き合い  
+同士、-同士は反発する



プラスの電極を通り過ぎた瞬間に  
電極のプラスとマイナスを入れ替える




# 加速器

荷電粒子を加速する装置

電磁気学の応用

+と-の電荷は引き合い  
+同士、-同士は反発する



プラスの電極を通り過ぎた瞬間に  
電極のプラスとマイナスを入れ替える




# 加速器

荷電粒子を加速する装置

電磁気学の応用

+と-の電荷は引き合い  
+同士、-同士は反発する



前方のプラス電極に引き寄せられ  
後方のマイナス電極からは反発力を受ける



# 線形加速器 と 円形加速器


加速部分を直列にたくさん並べる



東北大学電子光物理学研究センター  
300MeV 電子LINAC

加速部分は一カ所  
円形にビームを回すことにより  
何回も加速させる

東北大学電子光物理学研究センター  
1.2GeV 電子シンクロトロン



東北大学サイクロトロンRIセンター  
サイクロトロン  
(陽子、原子核を加速)




# 加速器の応用


医療目的

電子線、ガンマ線、  
陽子・原子核ビーム  
を用いた  
診断およびガン治療

PET（陽電子放出断層撮影）



<http://kakuigaku.cyric.tohoku.ac.jp/activities.html> より



<http://www.nirs.go.jp/rd/collaboration/himac/outline.shtml> より



重粒子線棟



# 加速器の応用

## 非破壊検査 物質の構造解析

放射光（赤外線からX線まで）  
中性子を使用

茨城県つくば市  
KEK フォトンファクトリ

[http://j-parc.jp/Acc/ja/img/accelerator\\_ja.jpg](http://j-parc.jp/Acc/ja/img/accelerator_ja.jpg)

RCS

周長300m  
3GeVシンクロトロン 25Hz

MR

周長1600m  
30GeVシンクロトロン

LINAC

全長300m  
181MeV 25Hz

ハドロン実験施設

物質・生命科学実験施設

ニュートリノ実験施設

茨城県東海村  
大強度陽子加速器施設  
(J-PARC)の  
物質・生命科学実験施設

兵庫県佐用郡佐用町  
Spring-8 大型放射光施設

[http://www.spring8.or.jp/ja/news\\_publications/press\\_release/2009/090605\\_fig/fig4.png](http://www.spring8.or.jp/ja/news_publications/press_release/2009/090605_fig/fig4.png)

[http://pfwww.kek.jp/outline/pf/PF-Pamph2012\\_08.pdf](http://pfwww.kek.jp/outline/pf/PF-Pamph2012_08.pdf)

2012/11/21 大曲高等学校 出前授業



# これまでの 私の研究で使った 加速器施設



# 大学院生時代

CERN

(欧州合同原子核研究所)  
の加速器SPSを用いた  
高エネルギー原子核衝突実験


国際共同実験

アメリカ、スウェーデン、  
デンマーク、フランス、日本  
から11の大学・研究所、約40名  
に参加

宇宙初期にあったと考えられ  
る、クォーク・グルーオン・  
プラズマ探索実験



実験準備作業中



検出器

フランス

スイス

CERN

SPS



測定室での  
ミーティング前



週末、近くの  
村の朝市へ

←ジュネーブ







# ポスドク研究員時代

ブルックヘブン国立研究所の加速器RHICを用いた  
高エネルギー原子核衝突実験

STAR

PHENIX

に参加 (それぞれ400名程度)





# 現在

## 電子ビームを用いたストレンジネス核物理

Physical Map of the World, April 2004

Legend  
Country  
Island group  
Capital  
Independent state  
Dependency or area of special sovereignty  
Island / island group  
Capital


アメリカ合衆国  
ヴァージニア州  
ジェファークソン研究所



ドイツ  
マインツ大学



日本、東北大学  
電子光物理学研究センター





# 基礎科学の意義 に関する逸話を少し





# 基礎科学

19世紀英国の大蔵大臣 William E. Gladstone

Michael Faradayの電磁誘導の演示実験を見学した後に

「で、これは何の役に立つのかね？」

「何の役に立つか分かりませんが、  
いつの日か、閣下はこれに  
税金をかけるようになるでしょう」

Michael Faraday



# 基礎科学

アナウンサー

「ニュートリノの研究は、  
どのように役立つんでしょうか？」

「役に立たないよ」

小柴昌俊

2002年ノーベル物理学賞

「天体物理学とくに宇宙ニュートリノの検出に対するパイオニア的貢献」  
により、レイモンド・デイヴィスと共に



# 基礎科学

1969年、アメリカ合衆国

原子力エネルギーについての両院合同委員会でJohn Pastore上院議員

「数百万ドルする粒子加速器が

我が国も守るのにどの様に役に立つんだ？」

「加速器は我が国を守るのに

直接には役に立ちませんが、

守るのに値する国にすることが出来ます」

Robert R. Wilson（米国物理学者）

マンハッタン計画グループリーダー

フェルミ国立加速器研究所の初代所長



科学 ≠ 技術



# まとめ：素粒子・原子核の実験研究

- 人間・世界の起源を追い求める基礎科学
  - 知的好奇心に基づく
  - 直接、応用（“役に立つ”）を考えない
- 理学・工学の知識を集約した総合科学
  - 実験に必要な検出器・測定器
    - 研究者が自ら設計・製作を行う
    - 電磁気学の応用、粒子（素粒子・原子核等）と物質の相互作用
  - 周辺から応用が生まれてくる
    - 放射線検出器、医学分野での診断・治療、等
    - GPS（一般相対性理論）、半導体技術（量子力学）
    - World Wide Web
      - CERNの物理学者 Sir Timothy John Berners-Lee によって開発





# 付録



# 放射性物質と 放射線



1 Bq の放射性物質が何グラムになるか

$$2.40 \times 10^{-24} \times \text{質量数} \times \text{半減期[秒]}$$

セシウム 1 3 7 ( $^{137}\text{Cs}$ ) の半減期は 30.1 年  
( $=30.1 \times 365 \times 24 \times 60 \times 60 = 949233600 \simeq 9.49 \times 10^8$  [秒])

この計算式は <http://www.gakushuin.ac.jp/~881791/housha/details/BqGySv.html> から引用



# 指数表示

# 小さな数字や大きな数字の表し方

例 1 : アボガドロ定数 ( $^{12}\text{C}$  12 g 中の原子の数)

602000000000000000000000

$$\Rightarrow 6.02 \times 10^{23}$$



# 指数表示

# 小さな数字や大きな数字の表し方

## 例 2 : $^{12}\text{C}$ 原子一つの質量

$$^{12}\text{C} \text{ 1 g 中の原子の数 } 6.02 \times 10^{23} / 12 = 5.02 \times 10^{22}$$

$$\Rightarrow 2.0 \times 10^{-23}$$

$$10^{-1} = 1 / 10^1 = 1/10 = 0.1$$

$$10^{-2} = 1 / 10^2 = 1/100 = 0.01$$

$$10^{-3} = 1 / 10^3 = 1/1000 = 0.001$$

• • • • •


$$10^{-23} = 1 / 10^{23} = 1 / 1000000000000000000000000$$
$$= 0.000000000000000000000001$$



# 指数表示

掛け算が簡単になる

$$50200000000 \times 230000$$




$$\begin{aligned} & 5.02 \times 10^{10} \times 2.3 \times 10^5 \\ &= 5.02 \times 2.3 \times 10^{10} \times 10^5 \\ &= 5.02 \times 2.3 \times 10^{10+5} \\ &= 11.546 \times 10^{16} = 1.1546 \times 10 \times 10^{16} \\ &= 1.1546 \times 10^1 \times 10^{16} = 1.1546 \times 10^{1+16} \\ &= 1.1546 \times 10^{17} \end{aligned}$$

桁の数を最初から数えて計算している





# 放射線の遮蔽





# 天然に存在する放射性物質

## ・カリウム40

半減期：12.77億年、地球が出来るときから存在している  
天然カリウムの中に0.0117%の割合で存在

天然カリウム1gあたり30.4 Bqの放射能を持つ  
成人で体内に数千Bqある

カリウムは、生物にとって必須元素

カリウム不足は、高血圧、低カリウム血症等を起こす  
1年あたり165  $\mu\text{Sv}$ の内部被曝と評価されている

## ・炭素14

宇宙線による生じた中性子が窒素に吸収されて生成される  
1年あたり10  $\mu\text{Sv}$ の内部被曝と評価されている

## ・ラドン及びその娘核種

よく知られているのは温泉  
花崗岩に多く含まれている


呼吸による内部被曝の主な原因（肺がんのリスク要因の一つ）  
日本は世界平均よりも少ないレベル




# 放射能・放射線量の変化

- 2011年4月の時点で  $^{134}\text{Cs}$ : $^{137}\text{Cs}$  のベクレル数での比は約1:1
  - $^{134}\text{Cs}$  : 半減期 約2.06年
  - $^{137}\text{Cs}$  : 半減期 約30.17年
- 同じベクレル数でも、放射線の強さ（等価線量率, Sv/h の単位で測る）は、核子の種類によって異なる
  - $^{134}\text{Cs}$  は、 $^{137}\text{Cs}$  の約2.7倍

放射能 [Bq]



空間線量率 [ $\mu\text{Sv}/\text{h}$ ]





2011年4月からの経過年



# $\alpha$ 線

## ・ 物理的性質

- 主に質量数の大きい不安定原子核から放出される
  - ・ トンネル効果
- 電荷 +2
- 陽子2個と中性子2個から成る ( ${}^4\text{He}$ の原子核)
- 電子の側を通過するとき電子をはがす
  - ・ 電離





# $\alpha$ 線




- ・ 飛距離 (Range)
  - 短い距離でエネルギーを失う
    - ・ 透過能力は高くない
    - ・ 空気に対して数cm程度
- ・ 防御物 (Shield)
  - 紙
  - 皮膚の表面
- ・ 生物学的危害 (Biological hazard)
  - 体外被曝
    - ・ 外から $\alpha$ 線を人体に照射しても表皮で止まってしまうので影響はない
  - 体内被曝
    - ・ もし $\alpha$ 線源を体内に取り込んでしまうと、放射性物質が無くなるまで浴び続ける



# β線


## 物理的性質

- 電荷 1
- $\beta^-$  (電子) と  $\beta^+$  (陽電子)
  - ・  $\alpha$  線に比べると質量は7000分の1程度
- 原子核中で陽子 (中性子) が中性子 (陽子) に崩壊するときに放出される



## このプロセスは三体崩壊

- ・ 電子の持つエネルギーは0からある最大値までいろいろな値を持つ
- β線を出さずに陽子が中性子に変わるプロセスもある (電子捕獲, Electron Capture)
  - ・ 軌道上の電子を陽子が捕獲



- ・ 空いた軌道に上の軌道が電子が移動する際にX線(電磁波)が放出される



# β線

- ・ 飛距離 (Range)
  - α線よりは遠くまで届く
    - ・ 空気に対して数m程度
    - ・ 皮膚の表面に線源をおいた場合でも2,3mm程度しか進まない
- ・ 防御物 (Shield)
  - 数ミリ厚のプラスチック、アルミ、ガラス、木
  - 密度の高い物質（鉛など）は電子が当たることによってX線を出すので逆に危険
- ・ 生物学的危害 (Biological hazard)
  - 体外被曝
    - ・ 皮膚や眼球に対して危険
    - ・ 内蔵や骨までには届かない
  - 体内被曝
    - ・ α線源よりはダメージが少ない



# $\gamma$ 線/X線

## ・ 物理的性質

- 電磁波
- 電荷を持たない
- $\gamma$ 線とX線の違いは発生機構

### ・ $\gamma$ 線

- 原子核内の核子が励起状態からエネルギーの低い状態へ遷移する時に余分なエネルギーが電磁波として放出される

### ・ X線

- 軌道電子が励起状態からエネルギーの低い状態に遷移する際に放出される
  - » 電子捕獲によるもの
    - » 陽子が軌道電子を捕獲、空いた軌道に上の軌道から電子が落ちて来るときにX線が放出される
  - » 内部転換によるもの
    - » 原子核のエネルギーが直接電子の軌道に与えられることがあり、主にK殻の電子が放出され、L殻等の電子がK殻に落ちて来るときにX線が放出される
- X線が出る代わりに別の電子が放出されることもある：オージェ電子



# $\gamma$ 線/X線

- ・ 飛距離 (Range)
  - 長く透過力が強い
    - ・ 電離作用は強くない
- ・ 防御物 (Shield)
  - 密度の高い物質を用いる
  - 鉛、鉄、コンクリートなど
- ・ 生物学的危害 (Biological hazard)
  - 体外被曝
    - ・ 透過力が高いことから体全体が被曝する
  - 体内被曝
    - ・ 放射性物質の近くだけではなく体の広い範囲で被曝する




# 中性子

## ・ 物理的性質

- 不安定原子核から放出
- 中性子は電荷を持たない
- 質量は陽子とほぼ同じ
  - ・  $m_n = 939.6$  ( $m_p = 938.3$ ) [MeV/c<sup>2</sup>]
- 電子とは相互作用しない
- 中性子と反応した原子核から放出される放射線により、間接的に電離が行われる



中性子と  
原子核の  
反応



中性子が吸収され  
 $\gamma$ 線が原子核から  
放出される



核子を原子核から  
はじき飛ばす



# 中性子

- ・ 飛距離 (Range)

- 他の放射線に比べて比較的遠くまで届く
- 空気中での平均自由行程（一回相互作用するまでに進む距離の平均）
  - ・ 220 m

- ・ 遮蔽 (Shield)

- 水、ポリエチレン、コンクリート
  - ・ 同程度の質量の陽子との衝突では、陽子に運動量の殆どを渡して中性子は静止する。
    - ボールの集めたなかに、ボール一つを投げてるとすぐ静止する
    - 質量数の大きな物質とでは、壁にボールをぶつけるようなもの

- ・ 生物学的危害 (Biological hazard)

- 体全体で被曝する
- 強い透過力を持つ




# その他の放射線

## ・ 宇宙線

- 常に地球に降り注いでいる
  - ・  $10 \text{ cm}^2$  辺り 1秒間に一個程度
- 最初に地球の大気に突入するのは陽子や原子核等
- 地表から5km程度では殆ど $\mu$ 粒子
  - ・ 大気との相互作用でパイ中間子を生成、パイ中間子が $\mu$ 粒子に崩壊し地上に届く
  - ・ 平均寿命は  $2.2 \times 10^{-6} \text{ [s]}$ 
    - 光速( $3 \times 10^8 \text{ [m/s]}$ )近くまで加速された場合
      - » 相対論効果を考えないと、進む距離は  $6 \times 10^2 \text{ [m]}$
      - » 相対論効果を考慮
        - »  $\mu$ 粒子の質量は  $105.7 \text{ [MeV]}$ ,
        - »  $1 \text{ GeV}/c$  の運動量を持つ場合、静止系で観測した寿命は約10倍に伸び、  $6 \times 10^3 \text{ [m]}$  程度まで届く



# 40Kの崩壊図




$^{40}\text{K}$  の出す  $\gamma$  線を数えて個数/秒が分かったとする、  
 実際に崩壊している  $^{40}\text{K}$  は  $\gamma$  線の個数の約 10 倍存在している。  
 たとえば、 $\gamma$  線が 100 [個/秒] 出ているとすると、 $^{40}\text{K}$  は 938 [Bq] あることを意味する。

崩壊図の出典: <http://www.nndc.bnl.gov>




# 134Csの崩壊図





# 137Csの崩壊図



原子核がとれる  
エネルギー状態  
は飛び飛び

高いエネルギー状態から  
低い方に変わっていく

この時、二つの状態の  
エネルギー差が $\gamma$ 線  
として放出される


とれる状態が複数あると  
経路も増える  
→ 複数個の $\gamma$ 線を出す

$^{137}\text{Cs}$ の場合、  
一個の原子核が $\beta$ 崩壊  
すると、661.7 keV  
の $\gamma$ 線が0.947個で  
ると考えて差し支えない

崩壊図の出典: <http://www.nndc.bnl.gov>



# 131Iの崩壊図



γ線の出る確率が高い順

- 1 番目 364.5 keV (81.5 %)
- 2 番目 637 keV (7.16 %)

$^{131}\text{I}$  がβ崩壊  
した後に出来る  
 $^{131}\text{Xe}$ の状態

I(%) の数値が  
表示されている  
ところにしか  
いかない

崩壊図の出典: <http://www.nndc.bnl.gov>



# 降雨と放射線量率の関係

縦軸は対数表示

雨が降ると大気中に浮かんでいる天然放射性物質  
Bi-214（半減期20分）が落ちてきて線量率が上がる




図 日本分析センターにおける空間放射線量率の測定結果

2011/5/31  
日本分析センター調べ

出典: [http://www.jcac.or.jp/lib/senryo\\_lib/nodo.pdf](http://www.jcac.or.jp/lib/senryo_lib/nodo.pdf) 4ページ



# 38Cl誤検出にまつわる話

早野龍五(@hayano)氏のツイートより

2011年4月10日  
(ちょっとテクニカルだけど、質問が多かったので) **Cl-38**検出のみに基づいて再臨界を論じてはいけないわけ(及び、塩素38m検出誤りについて再掲 <http://bit.ly/h5xRwZ>).  
<http://plixi.com/p/91019372>

2011年4月1日  
【April Foolにしても、ありえない!】ガンマ線による東電の核種の同定に、明らかな間違いあり. プロなら全員同意するはず. もとのガンマ線スペクトル, 一度見せてください→ @OfficialTEPCO  
<http://plixi.com/p/88437524>

<https://twitter.com/#!/hayano/status/53594238520270848>

## Cl-38検出のみに基づいて再臨界を論じてはいけないわけ

▶ 3/25夜、塩素-38検出と報道

▶ 再臨界→大量な中性子→海水中の塩素-37が中性子捕獲→塩素-38.  
塩素-38が見えた→再臨界というのがロジック  
(塩素-37の中性子捕獲断面積は 0.43b, 同位体存在比 24%.  
塩素-38の半減期37分, 1642.7 keVと2167.4 keVのガンマ線を出す.)


▶ しかし待て

▶ 塩=NaCl. 海水中にはナトリウム-23もある.  
ナトリウム-23が中性子捕獲→ナトリウム-24も検出されるはず.  
(ナトリウム-23の中性子捕獲断面積は 0.40b, 同位体存在比 100%.  
ナトリウム-24の半減期14.9時間, 1368.6 keVと2754.0 keVのガンマ線を出す.  
塩素-38が $1.6 \times 10^6$  Bq/cm<sup>3</sup>あったなら, ナトリウム-24も $2.6 \times 10^6$  Bq/cm<sup>3</sup> - 溜まり水で検出されたヨウ素-131と同じくらいの検量 - は検出されるはずだ.)

▶ しかし, ナトリウム-24は検出されていない!

▶ 東電が4/1に塩素-38m検出という, 明らかな間違いをやったことも考えると (<http://bit.ly/h5xRwZ>),  
塩素-38が見えた→「すわ再臨界」は早計.

23 : 10 1号機に隣し、タービン建屋1階にある水溜りから300万ベクレルの放射線量を検出  
※ 1号機タービン建屋地下溜まり水の測定結果  
→ Cl (塩素)-38 濃度:  $1.6 \times 10^6$  Bq/cm<sup>3</sup>  
Ar (アルゴン)-34 濃度:  $3.9 \times 10^6$  Bq/cm<sup>3</sup>  
Y (イットリウム)-91 濃度:  $5.2 \times 10^6$  Bq/cm<sup>3</sup>  
I (ヨウ素)-131 濃度:  $2.1 \times 10^6$  Bq/cm<sup>3</sup>  
Cs (セシウム)-134 濃度:  $1.6 \times 10^6$  Bq/cm<sup>3</sup>  
Cs (セシウム)-136 濃度:  $1.7 \times 10^6$  Bq/cm<sup>3</sup>  
Cs (セシウム)-137 濃度:  $1.8 \times 10^6$  Bq/cm<sup>3</sup>  
La (ランタン)-140 濃度:  $3.4 \times 10^6$  Bq/cm<sup>3</sup>  
<http://www.kantei.go.jp/saijisi/pdf/201104091700genpatsu.pdf> より



## April Foolにしても、これはありえない。

<http://www.nisa.meti.go.jp/earthquake/monitor.pdf>

にて公開された福島【第二】原発敷地内空気から塩素-38m検出.

これは東電の測定が間違っていると断言できます. プロなら誰でもすぐに変だと分かる.  
ガンマ線スペクトルを見せてください→TEPCO

図はWiley-Interscience Table of Isotopes CD-ROM Eighth Edition, 1998より転載

| 核種     | 3月17日                        |                              | 3月18日                        |                              | 3月19日                        |                              | 3月20日                        |                              |
|--------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|        | 放射性物質濃度 (Bq/m <sup>3</sup> ) | 放射性物質濃度 (Bq/m <sup>3</sup> ) | 放射性物質濃度 (Bq/m <sup>3</sup> ) | 放射性物質濃度 (Bq/m <sup>3</sup> ) | 放射性物質濃度 (Bq/m <sup>3</sup> ) | 放射性物質濃度 (Bq/m <sup>3</sup> ) | 放射性物質濃度 (Bq/m <sup>3</sup> ) | 放射性物質濃度 (Bq/m <sup>3</sup> ) |
| I-131  | 8.43E-05                     | 3.35E-04                     | 8.43E-04                     | 3.14E-05                     | 8.8E-05                      | 4.29E-03                     | 4.39E-05                     | 4.30                         |
| I-132  | ND                           | —                            | —                            | 1.73E-03                     | 3.82E-05                     | 8.02                         | 2.62E-03                     | 8.39E-05                     |
| I-133  | 3.30E-06                     | 4.67E-06                     | 0.00                         | ND                           | —                            | —                            | 5.24E-05                     | 4.21E-05                     |
| Cs-134 | 2.49E-05                     | 2.04E-05                     | 0.00                         | 3.89E-05                     | 2.04E-05                     | 0.00                         | 1.57E-04                     | 1.43E-05                     |
| Cs-136 | 3.31E-04                     | 1.88E-05                     | 0.17                         | 3.34E-04                     | 1.88E-05                     | 0.17                         | 4.86E-04                     | 1.53E-05                     |
| Cs-137 | 6.19E-05                     | 1.29E-05                     | 0.01                         | 5.88E-05                     | 1.01E-05                     | 0.01                         | 8.41E-05                     | 1.43E-05                     |
| Cl-38m | ND                           | —                            | —                            | ND                           | —                            | —                            | 3.18E-03                     | 3.29E-02                     |

<http://lockerz.com/s/88437524>

<http://lockerz.com/s/91019372>  
(plixi.com は、現在lockerz.com に変わっている)



# 38Cl誤検出にまつわる話(続き)

<http://www.meti.go.jp/press/2011/04/20110420006/20110420006-7.pdf>


6 ページ目

## (参考) 福島第一 1号機タービン建屋地下1階のたまり水 Cl-38核種分析の評価について

### ○再評価結果

福島第一1号機では、3月23日～25日の間、原子炉に海水注入しているため、Cl-37(n, γ)Cl-38反応により、塩素38が生成されているとの可能性はあった。

しかし、この場合、塩素と同様に炉内に持ち込まれたナトリウムも放射化され、塩素38より半減期が長いナトリウム24も検出されることが推測されるものの、ナトリウム24は検出されていない。このため、Cl-38が生成されたとは考えにくく、他の核種の散乱線などの影響でわずかに検出限界を超えたものと推測している。



注: Cl-37(n, γ)Cl-38 反応というのは、中性子がCl-37にあたり、Cl-38とγ線が出るという反応です。Cl-38が出来るのは、海水中に含まれる塩化ナトリウム (NaCl) が中性子と反応したということを意味します。中性子があるということは、原子炉内で再臨界が起こって核分裂反応が起きている証拠だと騒がれたのですが、データを見なかったこととデータを総合的に判断しなかった (Na-24が検出されていないことを無視していた) ことが間違いの原因です。

生データを見ることなしに、機械 (解析プログラム) の表示  
することを鵜呑みにすると間違っているにもかかわらず気がつかない!

2011年4月20日

東京電力が同じデータを再解析した結果についての発表

Cl-38は検出限界以下

[http://www.tepco.co.jp/cc/press/betu11\\_j/images/110420j.pdf](http://www.tepco.co.jp/cc/press/betu11_j/images/110420j.pdf)

1 ページ目

### 福島第一 1号機タービン建屋地下階の溜まり水の核種分析結果

(再評価) (3月25日参考配布) (変更理由) ※

| 採取場所             | 福島第一1号機<br>タービン地下溜まり水<br>(1回目) | 福島第一1号機<br>タービン地下溜まり水<br>(1回目) | — |
|------------------|--------------------------------|--------------------------------|---|
| 試料採取日            | 平成23年3月24日                     | 平成23年3月24日                     | — |
| 検出核種<br>(半減期)    | 試料濃度<br>(Bq/cm <sup>3</sup> )  | 試料濃度<br>(Bq/cm <sup>3</sup> )  | — |
| Cl-38<br>(約37分)  | 検出限界未満                         | $1.6 \times 10^5$              | ① |
| As-74<br>(約18日)  | 検出限界未満                         | $3.9 \times 10^2$              | ① |
| Y-91<br>(約59日)   | $5.2 \times 10^4$              | $5.2 \times 10^4$              | — |
| I-131<br>(約8日)   | $2.1 \times 10^5$              | $2.1 \times 10^5$              | — |
| Cs-134<br>(約2年)  | $1.6 \times 10^5$              | $1.6 \times 10^5$              | — |
| Cs-136<br>(約13日) | $1.7 \times 10^4$              | $1.7 \times 10^4$              | — |
| Cs-137<br>(約30年) | $1.8 \times 10^5$              | $1.8 \times 10^5$              | ③ |
| La-140<br>(約2日)  | $3.0 \times 10^2$              | $3.4 \times 10^2$              | ② |

※再発防止対策に基づき、①主要ピークによる核種の同定及び放射能濃度の決定、②放射平衡を踏まえた放射能濃度の評価により再評価を実施。その他、③データの転記誤りの修正を実施。



# ホール・ボディ・カウンター(WBC)

A社



椅子型

遮蔽がない  
自分で遮蔽を用意するか、  
バックグラウンドの放射線  
レベルの低い場所に設置  
しなければならない。

F社




ベッド型



チェア型  
周りに遮蔽がある

C社







# 宮城県周辺の 測定



# 空間線量率



「放射線量等分布マップ作成」プロジェクト  
地表1mの高さで実際に測定




航空機モニタリング  
上空(150-900 m)で測定を  
地表1mの高さに外挿

[http://radioactivity.mext.go.jp/ja/monitoring\\_around\\_FukushimaNPP\\_MEXT\\_DOE\\_airborne\\_monitoring/](http://radioactivity.mext.go.jp/ja/monitoring_around_FukushimaNPP_MEXT_DOE_airborne_monitoring/)



# 第3次航空機モニタリングの測定結果（空間線量率）の見直し結果と 文部科学省が6月に実施した約2,200箇所の空間線量率の測定結果の比較



文部科学省による 第4次航空機モニタリングの測定結果について（平成23年12月16日）、より

[http://radioactivity.mext.go.jp/ja/1910/2011/12/1910\\_1216.pdf](http://radioactivity.mext.go.jp/ja/1910/2011/12/1910_1216.pdf)

点がばらついていることに注意  
(50%位違う点がある)



# 仙台市青葉区での測定

測定地点: 仙台市青葉区  
測定器具: γサーベイメーター ALOKA TCS171  
(NaI カウンター)

測定者: 田村裕和

(東北大学理学研究科物理学専攻)

各測定点には±10%程度の誤差があります。また、これは簡易測定であり、測定方法による誤差もあります。

図の作成: 金田雅司

(東北大学理学研究科物理学専攻)

放射線量のデータ: <http://bit.ly/i3j1B7>

降水量: 日本気象協会, <http://tenki.jp>

天気: 測定者の観測

放射線量

- 屋外
- 雨の当たらない軒下
- ▲ 屋外の土に接触させて測定
- 室内(鉄筋コンクリート)

天気


- 晴れ
- 曇り
- 雨
- 雪
- 降水量

国連科学委員会(UNSCEAR)の2000年版の報告書による  
内部被曝と外部被曝の和の世界平均は  
年間 2.4 mSv (ミリ・シーベルト)  
= 年間 2400  $\mu$ Sv (マイクロ・シーベルト)  
= **1時間あたり 0.27  $\mu$ Sv (マイクロ・シーベルト)**

外部被曝(宇宙線+大地)のみでは、  
年間 0.87 mSv = **1時間あたり 0.10  $\mu$ Sv**

m(ミリ)は、1/1000 を意味し、 $\mu$ (マイクロ)はミリの1/1000。つまり、マイクロは、100万分の1。

仙台市青葉区の放射線量モニター (2011/3/13 - 2012/2/13)



平常時の空間線量(宮城県発表)


1時間あたり 0.03 ~ 0.05  $\mu$ Sv

<http://www.pref.miyagi.jp/gentai/Press/soudan/soudan00.htm>




# 福島第一原発敷地での測定と比較

放射線量率 [ $\mu\text{Sv/h}$ ]



3月から7月の  
測定値を表示

3月のベント、水素爆発  
以降は放射性物質の大気への  
大量放出は起きていない



福島第一原子力発電所構内での計測データ  
<http://www.tepco.co.jp/nu/fukushima-np/f1/index-j.html>  
より金田が作図




# 青葉山キャンパスの土壌測定

2011/6/25 測定

東北大学大学院理学研究科物理学専攻 原子核物理研究室

ガンマ線の個数 (6時間測定)



液体窒素タンク  
ゲルマニウム  
半導体検出器  
鉛ブロック

ガンマ線のエネルギー [デジタル化されたチャンネル数]

高いところで、Cs134, Cs137 あわせて 500Bq/kg 程度




# 土壌・食品中に含まれる 放射性物質の 測定を行う時の注意



# 空間線量率の測定









# 測定したガンマ線 どこから来た？



測定器が「見ている」  
ガンマ線


殆どは、別の場所から



# 遮蔽が不可欠




## セシウム 500Bq/kg の食品表面の空間線量



500Bq/kg のセシウム汚染食品 1kg

表面線量は 0.01μSv/h 程度



これなら楽勝？

注意) 1kg, 5kg, 10kgと増やしても, 0.03μSv/hぐらいで頭打ち

このページ内のスライドは、東京大学大学院理学系研究科早野龍五氏提供

2011年10月21日のニコニコ生放送

「緊急報告！アナタの食べ物は大丈夫？～放射線による食品汚染の実態に迫る～」  
で使われた説明のスライドから。

全てのスライドは

<http://www.slideshare.net/RyuHayano/nicohou> で見れます。



# 食品検査に使われる測定器の例

写真

あるメーカーの  
カタログから




サンプルを専用容器  
に入れて設置する場所

鉛で囲み  
バックグラウンドを  
遮蔽している

下の筒状の部分：  
NaI (ヨウ化ナトリウム)  
結晶とセンサーの入って  
いる場所

縦軸：一秒あたりのガンマ線の個数



横軸：ガンマ線のエネルギー

あるエネルギーのガンマ線が1秒辺り  
何個来たかという数字からベクレルに換算  
(この換算方法に注意が必要)



# 放射能の測定


## ガンマ線

エネルギー  
個数

核種ごとにBq数を見積もる



ピークが見える？




$^{134}\text{Cs}$ ,  $^{137}\text{Cs}$  のガンマ線の  
エネルギーの場所

写真：KEK野尻美保子氏のブログ <http://nojirimiho.exblog.jp/14639366/> より




## Nal 検出器で「やさしお®」を測定してみる

(天然放射性物質であるK40を多く含む)



Thursday, October 20, 11

おや, どうしてこうなっちゃうの?




Thursday, October 20, 11

このページ内のスライドは、東京大学大学院理学系研究科早野龍五氏提供

<http://www.slideshare.net/RyuHayano/nicohou> より





縦方向の「ギザギザ」：測定個数のゆらぎ  
ピークの横方向の広がり：分解能



# 放射能の測定

十分な遮蔽

測りたいガンマ線个数

ピークの下にあるゴミの正しい見積もり

検出効率の見積もり

通り抜けたガンマ線すべてを数えていない

そんなに簡単ではない